

Granulaire 12 % Article aliment médicamenté Coxistac(R)
(DIN # 02237631)

Le granulaire 12% Coxistac est un médicament coccidiostat pour les aliments pour poulets de chair, contenant le polyéther ionophore, salinomycine-sodium.

Coxistac permet aux poulets de chair d'atteindre leur poids de commercialisation plus rapidement et réduit les pertes dues à la coccidiose. Cela signifie une production plus efficace et plus rentable.

Ingrédient actif:

salinomycine-sodium..... 12%

Contient 120g/kg)

Description:

Particule granulaire blanc cassé à beige.

Formule:

Coxistac est une forme granulée de salinomycine-sodium.

Classification:

Coxistac (salinomycine-sodium) Granulaire 12% est listé dans la Brochure des Ingrédients Médicamenteux (M.I.B):

Poulets de chair: M.I.B No. 69

Caractéristiques:

.Large couverture coccidiostat contre les six espèces majeures d'*Eimeria*, y compris *E. acervulina*, *E. tenella*, *E. maxima*, *E. brunetti*, *E. necatrix*, *E. mitis* dans les poulets de chair. Les coccidies sont détruites plutôt qu'inhibées.

. Agit tôt dans le cycle de vie des coccidies: il détruit les sporozoïtes, trophozoïtes, et les schizontes à développement précoce avant que les volailles soient endommagées.

. Excellente marge d'efficacité: la dose recommandée fournit un haut niveau de protection pendant des périodes temporaires de faible absorption d'aliments causée par maladie ou le climat.

. Pas de période d'interruption

. Se mélange bien aux aliments.

Instructions pour le mélange:

Le médicament Coxistac doit être bien mélangé avec les aliments pour assurer une distribution égale.

Bien mélanger 0.5 kg de Granulaire 12% Coxistac avec 1.000 kg d'aliments complets pour obtenir des aliments médicamentés avec une concentration de salinomycine-sodium de 0,006% (60 mg/kg). Les aliments médicamentés peuvent être préparés sous forme de farine ou de boulettes.

Sécurité:

Les aliments médicamenteux Coxistac, quand utilisés comme indiqué peuvent être administrés aux poulets de chair sans crainte de toxicité animale, de problèmes de résidus ou de pollution environnementale.

Il faut faire attention de ne pas contaminer les aliments pour dindes, chiens et chevaux. Ce médicament est connu comme étant toxique à ces espèces.

Ne pas donner de tiamulin à des poulets à griller qui reçoivent des aliments médicamenteux au Coxistac.

Avertissement:

Ne pas donner à des poulets de remplacement, de reproduction ou à des pondeuses.

Affirmations et mode d'emploi		
Instructions pour utiliser avec des poulets de chair	Dosage et administration	Instructions
Pour aider à la prévention de la coccidiose dans les poulets de chair	Niveau de médicament: 60 ppm (60mg/kg) d'aliments complets	Donner aux poulets de chair. Aucune période de retrait requise.

Solutions totales ANIMAUX SAINS, ALIMENTS SAINS, MONDE SAIN
Total Solutions

Distribué par Bio Agri Mix LP, 11 Ellen Street, Michell Ontario, NOK 1NO
Bureau des commandes: 1.800.265.1763 - Commande Fax: 1.519.348.4100 -
www.phibroah.com

© 2017 Phibro Animal Health Corporation

Coxistac, Phibro, Le logo de Phibro et Animaux sains, aliments sains, monde sain sont des marques appartenant ou licenciées à Phibro Animal Health Corporation ou ses filiales .

CX17001/CAN/0217